

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสถานะฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินสถานการณ์ และการดำเนินงานทางทันตสาธารณสุขสำหรับการนำไปสู่การวางแผนป้องกันโรคฟันผุในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี 11 เดือน และ ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน ที่ได้รับการดูแลอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 5 ศูนย์ รวมทั้งหมด 190 คน โดยผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มประชากรตามคุณสมบัติ ที่กำหนดไว้

จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสถานะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็กที่ปราศจากฟันผุ จำนวน 39 คนและเด็กที่มีฟันผุ จำนวน 151 รวม 190 คน ผู้วิจัยได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายตามลำดับดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง ประกอบไปด้วยลักษณะทางประชากร ดังนี้

1. ลักษณะทางประชากรของเด็ก ได้แก่ เพศ อายุ และสถานะฟันผุ
2. ลักษณะทางประชากรของผู้ปกครอง ได้แก่ อายุ เพศ ความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน และจำนวนบุตรหลานในความเลี้ยงดู

ตอนที่ 2 ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมของผู้ปกครอง ได้แก่

1. พฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน
2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
3. ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
4. ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
5. การรับรู้ของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
6. การเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม และแหล่งอำนวยความสะดวก

7. การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก

8. การเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย

ตอนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของเด็กก่อนวัยเรียน
และผู้ปกครองกับสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน

ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับสภาวะ
ฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง

จากผลการศึกษาสภาวะฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 190 คน พบความชุกของการเกิดฟันผุร้อยละ 79.47

ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเด็กก่อนวัยเรียน

ข้อมูลทั่วไป	เด็กก่อนวัยเรียน	
	จำนวน (คน) N=190	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	91	47.89
หญิง	99	52.11
รวม	190	100.00
อายุ		
3 ปี	34	17.90
4 ปี	73	38.42
5 ปี	83	43.68
รวม	190	100.00
สภาวะฟันผุ		
ไม่ผุ	39	20.53
ผุ	151	79.47
รวม	190	100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าเด็กก่อนวัยเรียนเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.11 เพศชายร้อยละ 47.89 กลุ่มอายุ 5 ปี มีมากที่สุด ร้อยละ 43.68 รองลงมาอายุ 4 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ มีค่าเท่ากับร้อยละ 38.42 และ 17.90 ตามลำดับ สำหรับสภาวะฟันผุเท่ากับร้อยละ 79.47

ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง

ข้อมูลทั่วไป	ผู้ปกครอง	
	จำนวน (คน) N=190	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	75	39.47
หญิง	115	60.53
รวม	190	100.00
อายุ		
15-33 ปี	87	45.79
34-52 ปี	87	45.79
53-70 ปี	16	8.42
($\bar{X}$ =35.83 S.D.=10.31 Minimum=15 Maximum=70)		
รวม	190	100.00
ความสัมพันธ์กับเด็ก		
พ่อแม่	155	81.58
ลุง ป้า น้า อา	6	3.15
ปู่ ย่า ตา ยาย	28	14.74
อื่นๆ	1	0.53
รวม	190	100.00
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียนหนังสือ	48	25.26
ประถมศึกษา	66	34.74
มัธยมศึกษาตอนต้น	39	20.53
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	30	15.79
อนุปริญญา/ปวส	4	2.10
ปริญญาตรีขึ้นไป	3	1.58
รวม	190	100.00

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	ผู้ปกครอง	
	จำนวน (คน) N=190	ร้อยละ
อาชีพ		
เกษตรกร	33	17.37
รับจ้างทั่วไป	124	65.26
อาชีพส่วนตัว (ค้าขาย ตัดผม ตัดผ้า ฯ)	22	11.58
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	3	1.58
ไม่ได้ทำงาน	2	1.05
อื่น ๆ	6	3.16
รวม	190	100.00
รายได้ครัวเรือนต่อเดือน		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	84	44.21
5,000-10,000 บาท	93	48.95
สูงกว่า 10,000 บาท	13	6.84
รวม	190	100.00
จำนวนบุตรหลานที่อยู่ในความเลี้ยงดู		
1 คน	73	38.42
2 คน	86	45.26
3 คนขึ้นไป	31	16.32
รวม	190	100.00

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.53 เป็นเพศชาย ร้อยละ 39.47 กลุ่มอายุ 15-33 ปี และ 34-52 ปี ร้อยละ 45.79 เท่าๆ กัน อายุเฉลี่ย 35 ปี อายุต่ำสุด 15 ปี อายุสูงสุด 70 ปี มีความสัมพันธ์ในฐานะพ่อ แม่ของเด็กก่อนวัยเรียนมากที่สุด ร้อยละ 81.58 รองลงมาเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 14.74 ระดับการศึกษาของผู้ปกครองจบระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 34.74 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 25.26 จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 20.53

อาชีพของผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 65.26 เกษตรกรรม ร้อยละ 17.37 อาชีพส่วนตัว (ค้าขาย ตัดผม ตัดผ้าฯ) ร้อยละ 11.58 รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีมากที่สุดถึงร้อยละ 48.95 รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 44.21 จำนวนบุตรหลานที่อยู่ในความเลี้ยงดู มีจำนวน 2 คน ร้อยละ 45.26 มีจำนวน 1 คน ร้อยละ 38.42 และมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร้อยละ 16.32

ตอนที่ 2 ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมของผู้ปกครอง

ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวม

พฤติกรรม	ระดับพฤติกรรม			
	เหมาะสม		ไม่เหมาะสม	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวม	141	74.21	49	25.79

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ร้อยละ 74.21 และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 25.79 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่าพฤติกรรมการทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 จำนวนและร้อยละของการทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน

การทำความสะอาดช่องปาก	เด็กก่อนวัยเรียน	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
	N=190	
จำนวนครั้งในการแปรงฟัน		
ไม่แปรง	2	1.05
1 ครั้ง	43	22.63
2 ครั้ง	109	57.37
3 ครั้ง	36	18.95
รวม	190	100.00
ช่วงเวลาแปรงฟัน		
ตอนเช้า	47	24.74
ก่อนนอน	4	2.11
ตอนเช้าและก่อนนอน	97	51.05
ตอนเช้า กลางวันและก่อนนอน	42	22.10
รวม	190	100.00
การแปรงฟัน		
เด็กแปรงเอง	121	63.68
ผู้ปกครองแปรงให้บางครั้ง	46	24.21
ผู้ปกครองแปรงซ้ำให้เด็กทุกครั้ง	23	12.11
รวม	190	100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า จำนวนครั้งในการแปรงฟันของเด็กนั้น แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง มากที่สุดร้อยละ 57.37 รองลงมาแปรงฟันวันละ 1 ครั้ง ร้อยละ 22.63 และแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง ร้อยละ 18.95 ช่วงเวลาแปรงฟัน ตอนเช้าและก่อนนอน มากที่สุด ร้อยละ 51.05 และแปรงฟันเฉพาะตอนเช้า 24.74 สำหรับการแปรงฟันของเด็ก เด็กจะแปรงเองมากที่สุด ร้อยละ 63.68 มีผู้ปกครองแปรงให้บางครั้งร้อยละ 24.21 และผู้ปกครองแปรงซ้ำให้เด็กทุกครั้ง ร้อยละ 12.11

ตารางที่ 4.5 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนมห และเครื่องดื่ม โดยรวม

พฤติกรรม	ระดับพฤติกรรม					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การบริโภคอาหาร ขนมห และเครื่องดื่มโดยรวม	6	3.16	149	78.42	35	18.42

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนมห และเครื่องดื่มโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 78.42 และ ระดับต่ำ ร้อยละ 18.42 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนมห และเครื่องดื่ม มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนมห และเครื่องดื่ม จำแนกรายข้อ

ข้อความ	เป็นประจำ		บางครั้ง		ไม่เคยปฏิบัติ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เด็กของท่านรับประทานอาหารรสชาติหวานจัด	28	14.74	141	74.21	21	11.05
2. เด็กชอบอมข้าว	8	4.21	70	36.84	112	58.95
3. เด็กรับประทานผลไม้หลังรับประทานอาหาร	21	11.06	138	72.63	31	16.31
4. เด็กรับประทานขนมหวาน เช่น ลูกอม, ช็อกโกแลต, อมยิ้ม ฯลฯ	37	19.47	141	74.21	12	6.32
5. เด็กรับประทานขนมถุง/กรุบกรอบ เช่น โปเต้, ฝรั่ง, ข้าวโพดคั่ว, มันฝรั่งทอด ฯลฯ	87	45.79	99	52.11	4	2.10

ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

ข้อความ	เป็นประจำ		บางครั้ง		ไม่เคยปฏิบัติ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
6. เด็กรับประทานนมรสจืด	15	7.89	77	40.53	98	51.58
7. เด็กดื่มนมที่มีรสหวาน เช่น ช็อกโกแลต, วานิลลา, ไมโล, โอวัลติน, นมเปรี้ยว ฯลฯ	61	32.11	122	64.21	7	3.68
8. เด็กดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวาน	13	6.84	153	80.53	24	12.63
9. เด็กดื่มนมจากขวด	15	7.89	49	25.79	126	66.32
10. เด็กหลับคาขวดนม	8	4.21	22	11.58	160	84.21

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมที่เด็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติเป็นประจำ มากที่สุด คือ การรับประทานขนมถุง/กรอบกรอบ เช่น โปเต้, ปร๊าดี้, ข้าวโพดคั่ว, มันฝรั่งทอด ฯลฯ ร้อยละ 45.79 รองลงมา การดื่มนมที่มีรสหวาน เช่น ช็อกโกแลต, วานิลลา, ไมโล, โอวัลติน, นมเปรี้ยว ฯลฯ ร้อยละ 32.11 และเด็กรับประทานขนมหวาน เช่น ลูกอม, ช็อกโกแลต, อมยิ้ม ฯลฯ ร้อยละ 19.47

พฤติกรรมที่เด็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติเป็นบางครั้งที่พบมากที่สุด คือ เด็กดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวาน ร้อยละ 80.53 รองลงมา เด็กรับประทานอาหารรสชาติหวานจัด และเด็กรับประทานขนมหวาน เช่น ลูกอม, ช็อกโกแลต, อมยิ้ม ฯลฯ ร้อยละ 74.21 เท่าๆ กัน อันดับสุดท้ายเด็กรับประทานผลไม้หลังรับประทานอาหาร ร้อยละ 72.63

พฤติกรรมที่กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนไม่เคยปฏิบัติ ได้แก่ การหลับคาขวดนม มากที่สุด ร้อยละ 84.21 รองลงมาดื่มนมจากขวด ร้อยละ 66.32 และชอบอมข้าว ร้อยละ 58.95

ตารางที่ 4.7 จำนวนและร้อยละของความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม

ความรู้ของผู้ปกครอง	ระดับความรู้					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม	171	90.00	18	9.47	1	0.53

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 90.00 และ ระดับปานกลาง ร้อยละ 9.47 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่าความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 จำนวนและค่าร้อยละของความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก จำแนกรายข้อ

ข้อความ	ถูก		ผิด	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เด็กจะมีฟันน้ำนมขึ้นครบในช่วงอายุระหว่าง 2-3 ปี	158	83.16	32	16.84
2. ฟลูออไรด์ในยาสีฟันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุ	179	94.21	11	5.79
3. ฟันผุที่เป็นรู แต่ไม่มีอาการปวด บวม หรือเป็นหนอง สามารถรักษาได้โดยการอุดฟัน	158	83.16	32	16.84
4. การที่เด็กมีฟันผุนแรงหลายซี่ ทำให้เด็กเป็นโรคขาดสารอาหารได้	121	63.68	69	36.32
5. การดื่มนมจืดทำให้ฟันผุน้อยกว่าการดื่มนมหวาน	173	91.05	17	8.95
6. เด็กควรเริ่มแปรงฟันเมื่อมีฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่	101	53.16	89	46.84

ตารางที่ 4.8 (ต่อ)

ข้อความ	ถูก		ผิด	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
7. ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง ในตอนเช้า หลังอาหารกลางวันและก่อนนอน	170	89.47	20	10.53
8. ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบหมอฟันเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยทุก 6 เดือน	164	86.32	26	13.68
9. โรคฟันผุเป็นสาเหตุทำให้มีกลิ่นปาก	179	94.21	11	5.79
10. การแปรงฟันก่อนนอนเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ทำให้เสียเวลามาก	170	89.47	20	10.53

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องฟลูออไรด์ในยาสีฟัน ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุและโรคฟันผุเป็นสาเหตุทำให้มีกลิ่นปาก มีมากที่สุด ร้อยละ 94.21 เท่าๆกัน รองลงมาคือการดื่มนมจืดทำให้ฟันผุน้อยกว่าการดื่มนมหวาน ร้อยละ 91.05 อันดับสุดท้ายผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง ในตอนเช้า หลังอาหารกลางวันและก่อนนอน และการแปรงฟันก่อนนอนเป็นสิ่งจำเป็นและไม่ทำให้เสียเวลามาก ร้อยละ 89.47 เท่าๆกัน

ตารางที่ 4.9 จำนวน และร้อยละของความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวม

ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ ของผู้ปกครอง	ระดับความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวม	107	56.31	82	43.16	1	0.53

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 56.31 และระดับปานกลาง ร้อยละ 43.16 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่าระดับความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 จำนวน และร้อยละของความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน จำแนกรายข้อ

ข้อความ	เห็นด้วยมากที่สุด		เห็นด้วยปานกลาง		ไม่เห็นด้วย	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. การแปรงฟันเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนามัยในช่องปาก	171	90.00	19	10.00	0	0
2. ฟันผุไม่จำเป็นต้องถอนฟันเสมอ	43	22.63	129	67.90	18	9.47
3. ฟันน้ำนมจะหลุดเมื่อถึงวัยอันควร	133	70.00	48	25.26	9	4.74
4. ฟันผุเกิดจากกรรมพันธุ์	112	58.95	54	28.42	24	12.63
5. ฟันน้ำนมและฟันแท้มีความสำคัญเท่าๆ กัน	101	53.16	62	32.63	27	14.21
6. ฟันผุสามารถป้องกันได้	131	68.94	50	26.32	9	4.74
7. หากพ่อแม่มีฟันผุ ลูกก็จะมีฟันผุด้วย	116	61.05	54	28.42	20	10.53
8. การเก็บฟันของปู่ ย่า ตา ยาย ไว้สามารถป้องกันภัยอันตรายได้	110	57.89	50	26.32	30	15.79
9. การถอนฟันอาจทำให้เสียประสาทตา ทำให้ตาบอดได้	62	32.63	83	43.69	45	23.68
10. มีแมงกินฟันอาศัยในฟันทำให้เกิดฟันผุ	40	21.05	62	32.63	88	46.32

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองมีความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้ ผู้ปกครองเห็นด้วยมากที่สุดคือ การแปรงฟันเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนามัยในช่องปาก ร้อยละ 90.00 รองลงมา ฟันน้ำนมจะหลุดเมื่อถึงวัยอันควร ร้อยละ 70.00 และโรคฟันผุสามารถป้องกันได้ ร้อยละ 68.94

ข้อที่ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่ มีแมงกินฟันอาศัยในฟันทำให้เกิดฟันผุ ร้อยละ 46.32 รองลงมา การถอนฟันอาจทำให้เสียประสาทตา ทำให้ตาบอดได้ ร้อยละ 23.68 และการเก็บฟันของปู่ ย่า ตา ยาย ไว้สามารถป้องกันภัยอันตรายได้ ร้อยละ 15.79

ตารางที่ 4.11 จำนวนและร้อยละของการรับรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม

การรับรู้ของผู้ปกครอง	ระดับของการรับรู้					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม	112	58.95	75	39.47	3	1.58

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 58.95 และ ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.47 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่าผู้ปกครองมีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 จำนวนและร้อยละของการรับรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก
จำแนกรายข้อ

ข้อความ	ถูก		ผิด	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ฟันน้ำนมมีทั้งหมด 20 ซี่	145	76.32	45	23.68
2. การที่ฟันน้ำนมหลุดก่อนเวลาอาจทำให้ฟันแท้ที่ขึ้นมา บิดเก	96	50.53	94	49.47
3. ขนมหวาน น้ำอืดลมทำให้ฟันผุ	178	93.68	12	6.32
4. การแปรงฟันที่ถูกวิธีสามารถป้องกันฟันผุ	182	95.79	8	4.21
5. ควรแปรงฟันซ้ำให้เด็ก หลังจากเด็กแปรงฟันเสร็จ	137	72.11	53	27.89
6. การกินผัก และผลไม้ช่วยในการจัดทำความสะอาดฟัน	141	74.21	49	25.79
7. อาการปวดฟัน เป็นอาการเริ่มแรกของโรคฟันผุ	14	7.37	176	92.63
8. เด็กจะแปรงฟันสะอาดไม่จำเป็นต้องบิบบยาสีฟันให้เด็ก มากๆ	159	83.68	31	16.32
9. การให้เด็กอมข้าวไว้ในปากนานๆ ทำให้ฟันผุ	143	75.26	47	24.74
10. วิธีแปรงฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ ขยับ-ปิด	35	18.42	155	81.58

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองมีการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การแปรงฟัน
ที่ถูกวิธีสามารถป้องกันฟันผุ มากที่สุด ร้อยละ 95.79 รองลงมาคือการรับประทานขนมหวาน น้ำอืดลม
ทำให้ฟันผุ ร้อยละ 93.68 และเด็กจะแปรงฟันสะอาดไม่จำเป็นต้องบิบบยาสีฟันให้เด็กมากๆ ร้อยละ
83.68

ข้อที่ผู้ปกครองมีการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อาการปวดฟัน เป็นอาการเริ่มแรกของ
โรคฟันผุ มากที่สุด ร้อยละ 92.63 รองลงมา วิธีแปรงฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก คือ ขยับ-ปิด ร้อยละ
81.58 และการที่ฟันน้ำนมหลุดก่อนเวลาอาจทำให้ฟันแท้ที่ขึ้นมามีบิดเก ร้อยละ 49.47

ตารางที่ 4.13 จำนวนและร้อยละของการเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม และแหล่งอำนวยความสะดวก โดยรวม

การเข้าถึง	ระดับการเข้าถึง			
	สะดวก		ไม่สะดวก	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
แหล่งบริการทันตกรรม	167	87.89	23	12.11
แหล่งขายอาหาร ขนมห้างสำหรับเด็ก	176	92.63	14	7.37
แหล่งขายอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันเด็ก	161	84.74	29	15.26

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรมและแหล่งอำนวยความสะดวก โดยรวม ดังนี้ การเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรมมีความสะดวก ร้อยละ 87.89 การเข้าถึงแหล่งขายอาหาร ขนมห้างสำหรับเด็ก มีความสะดวก ร้อยละ 92.63 และการเข้าถึงแหล่งขายอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันเด็ก มีความสะดวก ร้อยละ 84.74 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายชื่อจะพบว่า การเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม และแหล่งอำนวยความสะดวก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 จำนวนและร้อยละของการเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม และแหล่งอำนวยความสะดวก จำแนกรายข้อ

การเข้าถึง	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. มีเจ้าหน้าที่ทันตกรรมออกมาตรวจฟัน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องการดูแลฟันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เด็กของท่านอยู่หรือไม่		
ไม่เคย	29	15.26
เคย	161	84.74
รวม	190	100.00

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

การเข้าถึง	จำนวน (คน)	ร้อยละ
2. หากเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปาก ท่านจะพาเด็กไปรับบริการที่ใด		
โรงพยาบาล	156	82.10
สถานีนอนมัย	17	8.95
คลินิก	13	6.84
อื่นๆ	4	2.11
รวม	190	100.00
3. ความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการที่สถานีนอนมัย/โรงพยาบาล/คลินิก เป็นอย่างไร		
สะดวก	167	87.89
ไม่สะดวก	23	12.11
รวม	190	100.00
4. ระยะเวลาในการเดินทางไปใช้บริการที่สถานีนอนมัย/โรงพยาบาล/คลินิก		
น้อยกว่า 30 นาที	95	50.00
30 นาทีขึ้นไป	65	34.21
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง	16	8.42
มากกว่า 1 ชั่วโมง	14	7.37
รวม	190	100.00
5. ในระยะทาง 1 กิโลเมตรจากบ้านท่านมีร้านขายขนมหรือไม่		
ไม่มี	14	7.37
มี 1-2 ร้าน	105	55.26
มี 3 ร้าน	21	11.05
มากกว่า 3 ร้าน	50	26.32
รวม	190	100.00
6. ท่านมักจะไปซื้ออาหารและขนมให้เด็กที่ไหน		
ร้านค้าในหมู่บ้าน	162	85.26

ตารางที่ 4.14 (ต่อ)

การเข้าถึง	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต	14	7.38
ตลาด	10	5.26
รถเข็น/รถเร่เข้ามาขาย	0	0
ทำเอง	2	1.05
อื่นๆ	2	1.05
รวม	190	100.00
7. ท่านสามารถหาซื้อแปรงสีฟันหรือยาสีฟันสำหรับเด็กได้ง่ายหรือไม่		
ยาก	10	5.26
ง่าย	180	94.74
รวม	190	100.00
8. ในหมู่บ้านของท่านมีร้านขายแปรงสีฟันหรือยาสีฟันสำหรับเด็กหรือไม่		
ไม่มี	29	15.26
มี	161	84.74
รวม	190	100.00
9. แหล่งหรือร้านค้าที่ท่านมักไปซื้อแปรงสีฟันหรือยาสีฟันให้เด็ก		
ร้านค้าในหมู่บ้าน	122	64.21
มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต	49	25.79
ตลาด	18	9.47
อื่นๆ	1	0.53
รวม	190	100.00
10. ท่านเคยได้รับแจกแปรงสีฟันและยาสีฟันจากเจ้าหน้าที่/ครู/ผู้ดูแลเด็กหรือไม่		
ไม่เคย	52	27.37
เคย	138	72.63
รวม	190	100.00

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองทราบว่า เคยมีเจ้าหน้าที่ทันตกรรมออกมาตรวจฟัน หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลฟันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 84.74 และไม่ทราบ ร้อยละ 15.26 เมื่อเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากผู้ปกครองส่วนมากจะพาเด็กไปรับบริการที่โรงพยาบาลมากที่สุดร้อยละ 82.10 รองลงมาคือ สถานีอนามัย ร้อยละ 8.95 ความสะดวกในการไปใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่า สะดวก ร้อยละ 87.89 โดยระยะเวลาในการเดินทางไปใช้บริการ น้อยกว่า 30 นาทีมากที่สุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาทีขึ้นไป เป็นร้อยละ 34.21 ในระยะทาง 1 กิโลเมตรจากบ้านมีร้านขายขนมในหมู่บ้านมากที่สุด คือ มีจำนวน 1-2 ร้าน ร้อยละ 55.26 รองลงมา มีจำนวนร้านขายขนมมากกว่า 3 ร้านในหมู่บ้าน ร้อยละ 26.32 แหล่งที่ผู้ปกครองไปซื้ออาหาร และขนมให้เด็กมากที่สุด คือ ร้านค้าในหมู่บ้าน ร้อยละ 85.26 รองลงมาคือ มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ร้อยละ 7.38 และ 5.26 ตามลำดับ สำหรับแหล่งการซื้อแปรงสีฟันหรือยาสีฟันสำหรับเด็ก ส่วนมากสามารถหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 94.74 โดยส่วนมากในหมู่บ้านมีร้านขายแปรงสีฟันหรือยาสีฟันสำหรับเด็ก ร้อยละ 84.74 แหล่งที่ผู้ปกครองมักไปซื้อแปรงสีฟันหรือยาสีฟันให้เด็กมากที่สุด คือ ร้านค้าในหมู่บ้าน ร้อยละ 64.21 รองลงมาคือ มินิมาร์ท/ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 25.79 สำหรับแปรงสีฟัน และยาสีฟันที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ มีผู้ปกครองเคยได้รับ ร้อยละ 72.63

ตารางที่ 4.15 จำนวนและร้อยละการได้รับข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม

การได้รับข่าวสารและการสนับสนุน	ระดับการได้รับ					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก โดยรวม	119	62.63	56	29.47	15	7.90

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าการได้รับข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 62.63 และระดับปานกลาง ร้อยละ 29.47 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่า การได้รับข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 จำนวนและร้อยละการได้รับข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก จำแนกรายข้อ

ข้อความ	เคย		ไม่เคย	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ท่านได้รับโปสเตอร์ แผ่นพับ ในการดูแลสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาล	110	57.89	80	42.11
2. ท่านได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจากทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่ทันตกรรม/ครู/ผู้ดูแลเด็ก	173	91.05	17	8.95
3. ท่านพาเด็กไปตรวจฟันที่โรงพยาบาล	109	57.37	81	42.63
4. เด็กได้รับการเคลือบฟลูออไรด์จากเจ้าหน้าที่ทันตกรรม	129	67.89	61	32.11
5. ท่านได้รับทราบผลการตรวจฟันของเด็กจากครู/ผู้ดูแลเด็ก	155	81.58	35	18.42
6. ท่านจัดหาแปรงสีฟันให้เด็ก หลังได้รับการแจ้งจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน	157	82.63	33	17.37
7. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากทางโทรทัศน์, สื่อต่างๆ , ใบปลิว, อินเทอร์เน็ต	127	66.84	63	33.16

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองเคยได้รับข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ดังนี้ ผู้ปกครองเคยได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กจากทันตแพทย์/เจ้าหน้าที่ทันตกรรม/ครู/ผู้ดูแลเด็ก มากที่สุด ร้อยละ 91.05 รองลงมา ผู้ปกครองเคยจัดหาแปรงสีฟันให้เด็ก หลังได้รับการแจ้งจากโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ร้อยละ 82.63 และผู้ปกครองเคยรับทราบผลการตรวจฟันของเด็กจากครู/ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 81.58

สิ่งที่ผู้ปกครองไม่เคยได้รับการสนับสนุน ได้แก่ การพาเด็กไปตรวจฟันที่โรงพยาบาล ร้อยละ 42.63 รองลงมา การได้รับโปสเตอร์ แผ่นพับ ในการดูแลสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาล

ร้อยละ 42.11 และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากทางโทรทัศน์, สื่อต่างๆ, ใบปลิว, อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 33.16

ตารางที่ 4.17 จำนวนและร้อยละของการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย โดยรวม

พฤติกรรม	ระดับพฤติกรรม					
	สูง		ปานกลาง		ต่ำ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
การเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย โดยรวม	27	14.21	149	78.42	14	7.37

จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 78.42 และ ระดับสูง ร้อยละ 14.21 เมื่อแยกพิจารณาออกเป็นรายข้อจะพบว่า พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 จำนวนและร้อยละของการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย จำแนกรายข้อ

ข้อความ	ปฏิบัติทุกครั้ง		ปฏิบัติบางครั้ง		ไม่เคยปฏิบัติ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ท่านชวนให้เด็กแปรงฟันโดยทำเป็นตัวอย่าง	62	32.63	84	44.21	44	23.16
2. ท่านชมเชยเมื่อเด็กทำตามที่ท่านสอน	74	38.95	73	38.42	43	22.63
3. ท่านอธิบายเหตุผลหากมีการทำโทษเมื่อเด็กทำผิด	70	36.84	77	40.53	43	22.63
4. ท่านให้เด็กรับประทานอาหารตรงเวลารอบ 3 มื้อ	78	41.05	66	34.74	46	24.21

ตารางที่ 4.18 (ต่อ)

ข้อความ	ปฏิบัติทุกครั้ง		ปฏิบัติบางครั้ง		ไม่เคยปฏิบัติ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
5. ท่านให้เด็กรับประทานอาหารจุกจิบระหว่างมื้อ เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำหวาน ลูกอม เยลลี่ ฯลฯ	46	24.21	83	43.68	61	32.11
6. ท่านตามใจเด็กเมื่อเด็กร้องไห้อยากรับประทานขนมหวาน เช่น ไอศกรีม น้ำหวาน ลูกอม เยลลี่ ฯลฯ	52	27.37	95	50.00	43	22.63
7. ท่านทำโทษเมื่อเด็กไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง	39	20.53	92	48.42	59	31.05
8. ท่านใช้ทำที่ที่นิมนวลแต่หนักแน่นแทนการข่มขู่เพื่อให้เด็กเชื่อฟังคำสั่ง	60	31.58	90	47.37	40	21.05
9. ท่านไม่ให้ความสนใจเมื่อเด็กมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ	59	31.05	86	45.27	45	23.68
10. ท่านไม่ให้ความสนใจเมื่อเด็กมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง	52	27.37	85	44.74	53	27.89

จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย โดยผู้ปกครองปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งที่พบมากที่สุด ได้แก่ การให้เด็กรับประทานอาหารตรงเวลาคบ 3 มื้อ ร้อยละ 41.05 รองลงมา ผู้ปกครองชมเชยเมื่อเด็กทำตามทีสอน ร้อยละ 38.95 และการอธิบายเหตุผลหากมีการทำโทษเมื่อเด็กทำผิด ร้อยละ 36.84

พฤติกรรมที่ผู้ปกครองปฏิบัติเป็นบางครั้งที่พบมากที่สุดคือ การตามใจเด็กเมื่อเด็กร้องไห้อยากรับประทานขนมหวาน เช่น ไอศกรีม น้ำหวาน ลูกอม เยลลี่ ฯลฯ ร้อยละ 50.00 รองลงมาผู้ปกครองทำโทษเมื่อเด็กไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง ร้อยละ 48.42 และการใช้ทำที่ที่นิมนวลแต่หนักแน่นแทนการข่มขู่เพื่อให้เด็กเชื่อฟังคำสั่ง ร้อยละ 47.37

ข้อที่ผู้ปกครองไม่เคยปฏิบัติตามที่สุด ได้แก่ การให้เด็กรับประทานอาหารจิบระหว่างมื้อ เช่น ขนมหวาน ไอศกรีม น้ำหวาน ลูกอม เยลลี่ ฯลฯ ร้อยละ 32.11 รองลงมา การทำโทษเมื่อเด็กไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่ง ร้อยละ 31.05 และไม่ให้ความสนใจเมื่อเด็กมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเอง ร้อยละ 27.89

ตอนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง กับสถานะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน

ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของเด็กก่อนวัยเรียนกับสถานะฟันผุ

ลักษณะทางประชากร	สถานะฟันผุ				P-value
	ไม่ผุ		ผุ		
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	
เพศ					1.000
ชาย	19	20.88	72	79.12	
หญิง	20	20.20	79	79.80	
รวม	39	20.53	151	79.47	
อายุของเด็กก่อนวัยเรียน					0.546
3 ปี	8	23.53	26	76.47	
4 ปี	17	23.29	56	76.71	
5 ปี	14	16.87	69	83.13	
รวม	39	20.53	151	79.47	

Chi-Square test ($P < 0.05$)*

จากตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรของเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ

ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน
กับสถานะฟันผุ

พฤติกรรมกรรมการทำความสะอาดช่องปาก	สถานะฟันผุ				P-value
	ไม่ผุ		ผุ		
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	
จำนวนครั้งในการแปรงฟัน					0.597
ไม่แปรง	0	0	2	100	
1 ครั้ง	9	20.93	34	79.07	
2 ครั้ง	25	22.94	84	77.06	
3 ครั้ง	5	13.89	31	86.11	
รวม	39	20.53	151	79.47	
การแปรงฟัน					0.700
เด็กแปรงเอง	25	20.66	96	79.34	
ผู้ปกครองแปรงให้บางครั้ง	8	17.39	38	82.61	
ผู้ปกครองแปรงซ้ำให้เด็กทุกครั้ง	6	26.09	17	73.91	
รวม	39	20.53	151	79.47	

Chi-Square test ($P < 0.05$)*

จากตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ

ตารางที่ 4.21 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้ปกครองกับสถานะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน

ลักษณะทางประชากร	สถานะฟันผุ				P-value
	ไม่ผุ		ผุ		
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	
อายุของผู้ปกครอง					0.883
15-33 ปี	17	19.54	70	80.46	
34-52 ปี	18	20.69	69	79.31	
53-70 ปี	4	25.00	12	75.00	
รวม	39	20.53	151	79.47	
เพศ					0.439
ชาย	18	24.00	57	76.00	
หญิง	21	18.26	94	81.74	
รวม	39	20.53	151	79.47	
ระดับการศึกษา					0.071
ไม่ได้เรียนหนังสือ	5	10.42	43	89.58	
ประถมศึกษา	15	22.73	51	77.27	
มัธยมศึกษาตอนต้น	10	25.64	29	74.36	
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช	5	16.67	25	83.33	
อนุปริญญา/ปวส	2	50.00	2	50.00	
ปริญญาตรีขึ้นไป	2	66.67	1	33.33	
รวม	39	20.53	151	79.47	

Chi-Square test ($P < 0.05$)*

จากตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรของผู้ปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ

ตารางที่ 4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะเศรษฐกิจของผู้ปกครองกับสถานะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน

สถานะเศรษฐกิจ	สถานะฟันผุ				P-value
	ไม่ผุ		ผุ		
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	
อาชีพหลัก					0.521
เกษตรกร	9	27.27	24	72.73	
รับจ้างทั่วไป	23	18.55	101	81.45	
อาชีพส่วนตัว (ค้าขาย ตัดผม ตัดผมๆ)	6	27.27	16	72.73	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	1	33.33	2	66.67	
ไม่ได้ทำงาน	0	0	2	100.00	
อื่นๆ	0	0	6	100.00	
รวม	39	20.53	151	79.47	
รายได้ครัวเรือนต่อเดือน					0.240
ต่ำกว่า 5,000 บาท	17	20.24	67	79.76	
5,000-10,000 บาท	17	18.28	76	81.72	
สูงกว่า 10,000 บาท	5	38.46	8	61.54	
รวม	39	20.53	151	79.49	

Chi-Square test ($P < 0.05$)*

จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่าสถานะเศรษฐกิจของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ

ตารางที่ 4.23 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางสังคมของผู้ปกครองกับสถานะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน

สถานะทางสังคม	สถานะฟันผุ				P-value
	ไม่ผุ		ผุ		
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	
ความสัมพันธ์กับเด็ก					0.955
พ่อแม่	32	20.65	123	79.35	
ลุง ป้า น้า อา	1	16.67	5	83.33	
ปู่ ย่า ตา ยาย	6	21.43	22	78.57	
อื่นๆ	0	0	1	100.00	
รวม	39	20.53	151	79.47	
จำนวนบุตรหลานในความเลี้ยงดู					0.835
1 คน	16	21.92	57	78.08	
2 คน	16	18.60	70	81.40	
3 คนขึ้นไป	7	22.58	24	77.42	
รวม	39	20.53	151	79.47	

Chi-Square test ($P < 0.05$)*

จากตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นว่าสถานะทางสังคม ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ

ตอนที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับสถานะฟันผุ
ของเด็กก่อนวัยเรียน

ตารางที่ 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับสถานะฟันผุของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

ตัวแปร	Chi-Square	df	P-value
พฤติกรรมในการทำความสะอาดช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน	0.052	1	0.819
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ขนมน และเครื่องดื่ม	2.035	2	0.361
ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก	0.882	2	0.643
ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก	3.457	2	0.178
การรับรู้ของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก	1.039	2	0.595
การเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม	2.245	1	0.134
การเข้าถึงแหล่งขายอาหาร ขนมนสำหรับเด็ก	0.361	1	0.548
การเข้าถึงแหล่งขายอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันเด็ก	0.274	1	0.601
การได้รับข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก	0.046	2	0.977
การเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย	0.629	2	0.730

จากตารางที่ 4.24 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมในการทำ ความสะอาดช่องปาก พฤติกรรม การบริโภคอาหาร ขนมน และเครื่องดื่ม ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การรับรู้ของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก การเข้าถึงแหล่งบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งขายอาหาร ขนมนสำหรับเด็ก การเข้าถึงแหล่งขายอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันเด็ก การได้รับข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก และการเลี้ยงดูเด็กให้มีวินัย ไม่มีความสัมพันธ์กับสถานะฟันผุ